



HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Premolac® Power Dose

Un ingrediente nutricional para alimentación animal. Cuando se utiliza como ingrediente comercial en alimentos concentrados, debe declararse como calostro bovino deshidratado. Association of American Feed Control Officials (AAFCO) No. 54.34.



ANÁLISIS TÍPICO

INMUNOGLOBULINA	IgG	150 gramos
		Inmunodifusión radial simple

ANÁLISIS PROXIMAL	Humedad	4.6%
	Ceniza	3.0%
	Proteína Bruta	73.0%
	Grasa Bruta	1.3%

DESCRIPCIÓN FÍSICA

Color	Blanco Leche
Textura	Microgranular
Características de la Partícula	Partícula Soluble
Solubilidad	El ingrediente activo es soluble
Empaque	Paquete de papel aluminio 1 dosis (335 gramos totales)

ALMACENAMIENTO Y MANEJO SEGUROS

Almacenaje, no exponerlo a la luz, resguardar en un lugar fresco y seco (40-80 grados F o 4-26 grados C). Evite tener el envase abierto durante mucho tiempo. Solo para uso oral, no para consumo humano. Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar la ficha de seguridad para más detalles.

INSTRUCCIONES DE USO

BOVINOS LECHEROS	Becerras	Mezclar y administrar con 1 dosis (335 g) según el envase en agua caliente (no más de 45°C) dentro de las 2 horas siguientes al nacimiento.)
BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE	Becerras	Mezclar y administrar con 1 dosis (335 g) según el envase en agua caliente (no más de 45°C) dentro de las 2 horas siguientes al nacimiento.
OVEJAS	Corderos	Mezclar según las instrucciones del envase y ofrecer al 10% del peso al nacer = 60 mL de calostro mezclado por cada 1 kg de peso al nacer.
CABRAS	Cabritos	Mezclar según las instrucciones del envase y ofrecer al 10% del peso al nacer = 60 mL de calostro mezclado por cada 1 kg de peso al nacer.
CABALLOS	Potrillos	Mezclar según las instrucciones del envase y ofrecer al 10% del peso al nacer = 60 mL de calostro mezclado por cada 1 kg de peso al nacer.
CERDOS	Lechones	Suplemento de 10 g de cerdo al día como complemento alimenticio sobre el alimento durante 5-7 días después del destete
ANIMALES DE COMPAÑÍA	Cachorros	Mezclar según las instrucciones del envase y ofrecer al 10% del peso al nacer = 60 mL de calostro mezclado por cada 1 kg de peso al nacer.
ESPECIALIDADES	Venados-Cervatillos	Mezclar según las instrucciones del envase y ofrecer al 10% del peso al nacer = 60 mL de calostro mezclado por cada 1 kg de peso al nacer.

Nota: es mejor mezclar el calostro fresco para cada alimentación.

Análisis Microbiológico

	Resultado	Método de prueba
E Coli	Negativo	AOAC Método Oficial 996.09
Salmonela	Negativo	AOAC Método Oficial 999.09
Coliforme	Negativo	AOAC Método Oficial 991.14
Estafilococo Áureo	Negativo	AOAC Método Oficial 2003.08
M. Para-tuberculosis	Negativo	PCR